

7月の管理

・除草

マルチの穴から発生した草は小さいうちに抜き、大きい草はハサミなどで根元から切りましょう。

・ネット上げ

草丈が伸長するに従い、倒れやすくなるため適宜ネットを上げましょう。台風接近や強風が予想される場合は、ネットを必ず草丈の2/3の位置まで上げる。補強の支柱を増やして対応しましょう。草丈が高い部分、低い部分でネットの高さを調整しましょう。

・早期発見早期防除（生育期間中最低2回防除）

葉っぱも商品です。特に害虫予防を徹底しましょう。

雨が続いた時などには葉っぱに黒い斑点がでる可能性があるため予防が必要です。



輪紋病

・病気



害虫による食害



草丈に合わせてネット上げ

病害名	農薬名	希釈倍数使用量	散布液量	使用回数
輪紋病	トップジンM水和剤	1500~2000倍	100~300リットル/10a	5回以内

・アブラムシ防除（アリがいたら防除必要）

害虫名	農薬名	希釈倍数使用量	散布液量	使用回数
アブラムシ類	オルトラン水和剤	1000~1500倍	100~300リットル/10a	5回以内
アブラムシ類	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	100~300リットル/10a	4回以内

・アザミウマ防除

害虫名	農薬名	希釈倍数使用量	散布液量	使用回数
アザミウマ類	オルトラン水和剤	1000~1500倍	100~300リットル/10a	5回以内
アザミウマ類	ダントツ水溶剤	2000~4000倍	100~300リットル/10a	4回以内

・葉や花を食べる害虫

害虫名	農薬名	希釈倍数使用量	散布液量	使用回数
オオタバコガ ハスモンヨトウ	プレオフロアブル	1000倍	100~300リットル/10a	4回以内

◎農薬を使用される際は、必ず農薬ラベルを確認し使用方法を守って使用しましょう。