



# ケイトウ「7月の管理」

## ● 除草

マルチの穴から発生した草は小さいうちに抜き、大きい草はハサミなどで根元から切りましょう。

## ● ネット上げ

草丈が伸長するに従い、倒れやすくなるため適宜ネットを上げましょう。台風接近や強風が予想される場合は、ネットを必ず草丈の2/3の位置まで上げる。補強の支柱を増やして対応しましょう。草丈が高い部分、低い部分でネットの高さを調整しましょう。

## ● 早期発見早期防除（生育期間中最低2回防除）

葉っぱも商品です。特に害虫予防を徹底しましょう。雨が続いた時などには葉っぱに黒い斑点ができる可能性があるため予防が必要です。



輪紋病



害虫による食害



草丈に合わせてネット上げ

### ◎ 病気

病害名	農薬名	希釈倍数使用量	散布液量	使用回数
輪紋病	トップジンM水和剤	1,500～2,000倍	100～300ℓ/10a	5回以内

### ◎ アブラムシ防除（アリがいたら防除必要）

害虫名	農薬名	希釈倍数使用量	散布液量	使用回数
アブラムシ	オルトラン水和剤	1,000～1,500倍	100～300ℓ/10a	5回以内
	ベストガード水溶剤	1,000～2,000倍	100～300ℓ/10a	4回以内

### ◎ アザミウマ防除

害虫名	農薬名	希釈倍数使用量	散布液量	使用回数
アザミウマ	オルトラン水和剤	1,000～1,500倍	100～300ℓ/10a	5回以内
	ダントツ水溶剤	2,000～4,000倍		4回以内

### ◎ 葉や花を食べる害虫

害虫名	農薬名	希釈倍数使用量	散布液量	使用回数
オオタバコガ ヨトウムシ類	アフーム乳剤	1,000倍	100～300ℓ/10a	5回以内

◎ 農薬を使用される際は、必ず農薬ラベルを確認し使用方法を守って使用しましょう。

## !! みんなで注意して安全安心な作物づくりに取り組みましょう !!

### ☆ 出荷前には必ず防除日誌の提出を行ってください

- ! 注意! 農薬散布前にその作物の登録があるか、ないかの確認を必ずお願いします
- ! 注意! 農薬散布前と後には防除日誌の確認・記入をお願いします
- ! 注意! 高温時の農薬散布は夕方涼くなってから行いましょう
- ! 注意! 予防的な農薬散布は基本、出荷休みの前日（金曜日）の夕方に行いましょう
- ! 注意! 希釈した農薬の散布量は登録範囲内とし、しっかり散布しましょう
- ! 注意! 毒劇物の購入については、印鑑が必要となります
- ! 注意! 風の向きに注意して他の作物にかからないよう注意してください

