

ケイトウ 「定植後の管理」

今からの管理・・・ネット上げ

遅れないように！

今からの管理・・・下葉かき



下葉かき前

下葉かき後
20cm程度



ネットを10cm
上げる

ネット上げ・・・草丈が伸長するに従い、倒れやすくなるため適宜ネットを上げる。台風接近が予想される場合や強い雨が降る場合はネットを花首の下位置まで上げる。また補強の支柱を増やして対応する。草丈が高い部分低い部分でネットの高さを調整する。

かん水・・・活着まではたっぷりかん水するが、活着後は干ばつがない限りかん水を必要としない。乾燥する圃場で草丈が短くて花が見えている圃場では、かん水を行い草丈を伸ばす。生育後半はかん水を控える。

株の勢いが悪い、葉の色が黄色、葉がばんざいしている圃場では液肥（トミ一液肥）500倍液を葉面散布 1週間おきに数回

病害虫対策は早期発見早期防除・・・葉っぱも商品なので病害虫防除を徹底する。

輪紋病



◎葉に黒い斑点（輪紋病・斑点病・黒班病）

病害虫	対策農薬	希釈倍数	散布液量	使用回数
輪紋病	トップジンM水和剤	1,500倍～ 2,000倍	100～300 リットル/10a	5回以内
黒班病	ポリオキシシンAL水溶剤	2,500倍	100～300 リットル/10a	8回以内

◎アブラムシ防除（アリがいたら防除必要）

対策農薬	希釈倍数	散布液量	使用回数
アルバリン 顆粒水溶剤	2,000～ 3,000倍	100～300 リットル/10a	5回以内
ベストガード 水溶剤	1,000～ 2,000倍	100～300 リットル/10a	4回以内