

除草剤散布適期

<初期剤>



ピラクロン
 ・フロアブル
 ・1キロ粒剤
 ○散布適期
 植代後～移植7日前または
 移植直後～ノビエ1.5葉期
 (但し移植後30日まで)
 『移植後5日までの散布が効果的』
 ☆田植同時散布機で施用可



サキドリEW
 ・フロアブル
 ○散布適期
 植代後～移植7日前または
 移植時～ノビエ1葉期
 (但し移植後30日まで)

体系①

初期剤+中後期剤

<初中期一発除草剤>

体系②

初期剤+

体系②

初期剤+
初中期


体系③

初中期一
発剤+


<中・後期剤>

処理体系の選択


- 体系①
●初期剤 + 中後期剤
- 体系②
●初期剤+初中期一発剤+中後期剤
- 体系③
● 初中期一発剤+中後期剤




エンペラー
 ・豆つぶ
 移植直後～ノビエ3葉期
 (但し、収穫75日前まで)
 成分数 3




カウントダウン
 ・1キロ粒剤
 ☆田植同時散布機で施用可
 移植時～ノビエ3.5葉期
 (但し、移植後30日まで)
 ・ジャンボ
 移植直後～ノビエ3.5葉期
 (但し、移植後30日まで)
 成分数 3



ジェイフレンド
 ・1キロ粒剤
 ☆田植同時散布機で施用可
 移植時～ノビエ3葉期まで
 (但し、移植後30日まで)
 ・ジャンボ・FG剤
 移植後5日～ノビエ3葉期
 (但し移植後30日まで)
 成分数 3



アツパレZ
 ・1キロ粒剤
 移植時～ノビエ3葉期
 (但し、移植後30日まで)
 (移植後5日からの使用を推奨)
 成分数 3



アシュラ
 ・1キロ粒剤 **New!!**
 ☆田植同時散布機で施用可
 移植時～ノビエ4葉期
 (但し、移植後30日まで)
 ・フロアブル
 移植時～ノビエ4葉期
 (但し、移植後30日まで)
 ・ジャンボ・FG剤 **New!!**
 移植直後～ノビエ4葉期
 (但し、移植後30日まで)
 成分数 3



ビクトリーZ
 ・1キロ粒剤
 移植時～ノビエ3葉期
 (但し、収穫60日前まで)
 ・ジャンボ・FG剤
 移植後5日～ノビエ3.0葉期
 (但し、収穫60日前まで)
 成分数 2



ゼータプラス New!!
 ・1キロ粒剤
 移植時～ノビエ3.5葉期
 (但し、移植後30日まで)
 成分数 2



カチボシ
 ・1キロ粒剤
 ☆田植同時散布機で施用可
 移植時～ノビエ2.5葉期
 (但し、移植後30日まで)
 成分数 3



デオーレ
 ・1キロ粒剤
 ☆田植同時散布機で施用可
 移植時～ノビエ3葉期
 (但し、移植後30日まで)
 ・ジャンボ
 移植後3日～ノビエ3葉期
 (但し、移植後30日まで)
 成分数 3



レブラス
 【ノビエ+広葉】
 ・1キロ粒剤・ジャンボ剤
 移植後14日～ノビエ4葉期
 成分数 4



ヒエクリーン
 【ノビエのみ】
 ・1キロ粒剤・豆つぶ
 移植後15日～ノビエ4葉期
 (但し、収穫45日前まで)
 成分数 1



トドメMF
 【ノビエのみ】
 ・1キロ粒剤
 移植後14日～ノビエ5葉期
 (但し、収穫50日前まで)
 ・乳剤
 移植後14日～ノビエ7葉期
 (但し、収穫50日前まで)
 ノビエが発生してから散布
 成分数 1



ウィードコア
 【ノビエ+広葉】
 ・1キロ粒剤
 移植後15日～ノビエ4葉期
 前まで)
 成分数 3



アレイルSC
 【ノビエ+広葉】
 移植後25日～ノビエ5葉期
 (但し、収穫45日前まで)
 成分数 2



バサグラン粒剤
 【広葉雑草のみ】
 ※落水して使用
 (3～4 kg/10a)
 移植後15日～55日
 (但し収穫60日前まで)
 成分数 1

ノビエ専用剤

広葉雑草専用剤