

令和6年産米 生産履歴簿(慣行栽培用)
(生産者自己点検チェックシート)

JALまね 営農経済センター

○ 記入後、出荷申込書とともにJAへ提出して下さい。

- 【注意事項】
1. 品種ごとに記入して下さい。
 2. 田植月日及び収穫月日について、作業日が複数の場合は初日の作業日を記入して下さい。
 3. 種子更新について記入して下さい。
 4. 使用した農薬・資材に○をし、10aあたりの使用量及び使用時期を記入して下さい。
 5. 液剤・水和剤については、散布した希釈液の量を記入して下さい。
 6. 同一の農薬・肥料を使用し、使用月日が異なる場合は最初の使用日を記入して下さい。
 7. 下記記載以外の薬剤を使用した場合は、空白欄に薬剤名を記入して下さい。
 8. ヘリコプター防除を行われた場合は、裏面へ記入して下さい。
 9. 肥料については、裏面に記入して下さい。

品種名	
種子更新	種子購入 ・ 苗購入 ・ なし
	購入先()
播種日	/
田植月日	/
出穂日	/
収穫月日	/

○登録農薬・農薬使用基準の順守、異品種混入の防止に努めたことを
確認の上、ご署名をお願いします。
※ゴム印使用の際や団体の場合は押印をお願いします。

住所	
自治会名	
氏名	
TEL	-

生育段階 対象 病害虫	農薬名	使用 農薬 に○	使用量 (10aあたり)	使用時期	使用基準(詳しくは農薬のラベルをご確認ください)		生育段階 対象 病害虫	農薬名	使用 農薬 に○	使用量 (10aあたり)	使用時期	使用基準(詳しくは農薬のラベルをご確認ください)		
					使用量 (10aあたり)	使用時期						使用量 (10aあたり)	使用時期	
育苗期	イチバン			月 日	500~1,000倍希釈		除 草 剤	レプラス1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後14日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)	
	ナエファインフロアブル		ml	月 日	1,000~2,000倍希釈 500ml/箱	播種時から緑化期		レプラスジャンボ		個	月 日	10個	移植後14日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)	
箱施用剤	ルーチンブライト箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日		中後期剤	アレイルSC		ml	月 日	500ml	移植後25日~ノビエ5葉期(収穫45日前まで)
	デジタルコラトップアクタラ箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日		ウィードコア1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後7日~ノビエ4葉期(収穫60日前まで)	
	デジタルメガフレア箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日					月 日			
	トリプルキック箱粒剤		g	月 日	50g/箱	移植3日前~移植当日					月 日			
	フルスロトル箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日		ヒエ専用剤	ヒエクリーン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫45日前まで)
	ヨーバルトップ箱粒剤		g	月 日	50g~75g/箱	播種時(覆土前)~移植当日			ヒエクリーン豆つぶ		g	月 日	250g	移植後15日~ノビエ4葉期(収穫45日前まで)
	稲名人箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日			トドメMF1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植後14日~ノビエ5葉期(収穫50日前まで)
	稲大将箱粒剤		g	月 日	50g/箱	播種時(覆土前)~移植当日			トドメMF乳剤		200ml	月 日	25~100%に希釈	移植後14日~ノビエ7葉期(収穫50日前まで)
初期剤	サキドリEW		ml	月 日	500ml	植代後~移植7日前、移植時~移植後30日まで	本 田 病 害 防 除 剤	いもち病		%	月 日	1,000倍希釈 60~150%	収穫7日前まで	
	ピラクロンフロアブル		ml	月 日	500ml	植代後~移植7日前、移植直後~移植後30日まで		ノンプラスフロアブル		%	月 日	60~150%	収穫7日前まで	
	ピラクロン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	植代後~移植7日前、移植時~移植後30日まで		ノンプラス粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで	
	先陣ジャンボ		個	月 日	10個	植代後~移植7日前、移植直後~移植後30日まで					月 日			
除 草 剤	ジェイフレンド1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期(移植後30日まで)		稲こうじ病 紋枯病	モンガリット粒剤		kg	月 日	3~4kg	収穫45日前まで
	ジェイフレンドジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後5日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)		紋枯病	モンカットフロアブル		%	月 日	1,000~1,500倍希釈 60~150%	収穫14日前まで
	ジェイフレンド400FG剤		g	月 日	400g	移植後5日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)		いもち病 紋枯病 ウンカ カメムシ	ブラシントレバリダ粉剤DL		kg	月 日	3~4kg	収穫14日前まで
	ピクトリーZ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期(収穫60日前まで)			ブラシントレバリダ水和剤		%	月 日	500倍希釈 60~150%	収穫14日前まで
	ピクトリーZジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後5日~ノビエ3葉期(収穫60日前まで)			アミスタートレボンSE		%	月 日	1,000倍希釈 60~150%	収穫14日前まで
	ピクトリー400FG剤		g	月 日	400g	移植後5日~ノビエ3葉期(収穫60日前まで)			いもち病 カメムシ ウンカ	ノンプラステレボン粉剤DL		kg	月 日	3~4kg
	デオーレ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期(移植後30日まで)		ビームスタークル粉剤5DL		kg	月 日	3~4kg	収穫7日前まで	
	デオーレジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後3日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)		トライKフロアブル		%	月 日	1,000倍希釈 60~150%	収穫14日前まで	
	カイリキZ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期(移植後30日まで)	カメムシ ウンカ	スタークル粉剤DL		kg	月 日	3kg	収穫7日前まで	
	カイリキZジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後3日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)		スタークル液剤10		%	月 日	1,000倍希釈 60~150%	収穫7日前まで	
	アシュラフロアブル剤		ml	月 日	500ml	移植時~ノビエ4葉期(移植後30日まで)		スタークル豆つぶ		kg	月 日	250g	収穫7日前まで	
	アシュラジャンボ剤		個	月 日	10個	移植時~ノビエ4葉期(移植後30日まで)					月 日			
	アシュラ400FG剤		g	月 日	400g	移植直後~ノビエ4葉期(移植後30日まで)					月 日			
	アツパレZ1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3葉期(移植後30日まで)					月 日			
	アツパレZジャンボ剤		個	月 日	10個	移植後3日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)					月 日			
	アツパレ400FG剤		g	月 日	400g	移植後3日~ノビエ3葉期(移植後30日まで)					月 日			
	カウントダウン1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ3.5葉期(移植後30日まで)				月 日				
	カウントダウンジャンボ剤		個	月 日	10個	移植直後~ノビエ3.5葉期(移植後30日まで)				月 日				
	エンペラー豆つぶ250		g	月 日	250g	移植直後~ノビエ3葉期(収穫60日前まで)				月 日				
	ゼータプラス1キロ粒剤		kg	月 日	1kg	移植時~ノビエ4葉期(移植後30日まで)				月 日				
中期剤	バサグラン粒剤		kg	月 日	3~4kg	移植後15日~55日(収穫60日前まで)				月 日				
				月 日						月 日				

	資材名	施用した 資材に ○	施用量 (10aあたり)	施用時期	施用基準(詳しくは稲作暦に記載)	
					施用量 (10aあたり)	施用時期
土づくり	堆肥		kg	月 日		耕起前
	ケイカル		kg	月 日	200kg	耕起前
	田んぼの守		kg	月 日	60~100kg	耕起前
	ミネラルG		kg	月 日	200kg	耕起前
					月 日	
生わら腐熟資材	石灰窒素		kg	月 日	20kg	秋耕起前
	ワラクサール		kg	月 日	20kg	秋耕起前
	豊土サングリーン(元肥用)		kg	月 日	5kg	秋耕起前
	豊土サングリーン(追肥用)		kg	月 日	5kg	
	アグリ革命アクア		ml	月 日	100ml	
基肥	苦土重焼燐		kg	月 日	10kg~20kg	
	リンスター30		kg	月 日	10kg~20kg	
	重焼燐ミックス		kg	月 日	20kg~40kg	
	ホスピタ		kg	月 日	20kg~40kg	
	化成肥料12-18-14		kg	月 日	15kg~35kg	
	固形40号		kg	月 日	18kg~35kg	
	ネオペースト1号		kg	月 日	15kg~25kg	
	ネオペースト2号		kg	月 日	18kg~34kg	
	水稻一発中晩生用		kg	月 日	30kg~40kg	
	セラコートRワン		kg	月 日	23kg~43kg	
	楽一21(全層一発)		kg	月 日	22.5kg~30kg	
	楽一20S(側条一発)		kg	月 日	30kg~40kg	
	けい酸加里入こめ太郎くん(元肥用)		kg	月 日	40kg	
	早生い〜ね755		kg	月 日	35kg~45kg	
	BB極早生専用一発442		kg	月 日	25kg~37kg	
					月 日	

	資材名	施用した 資材に ○	施用量 (10aあたり)	施用時期
つなぎ肥	珪酸加理プレミア34		kg	月 日
	豊土サングリーン(追肥用)		kg	月 日
	ホスピタ		kg	月 日
				月 日
穂肥	化成肥料17-0-17		kg	月 日
	穂肥34号		kg	月 日
	けい酸加里入こめ次郎くん(追肥用)		kg	月 日
	おてがるくんNK(流し込み肥料)		kg	月 日
				月 日
				月 日

※希釈散布量を記入する。

	農薬名	使用した 農薬に ○	使用量 (10aあたり)	使用時期
空中散布による防除	アミスタートレボンSE		㍩	月 日
	スタークル液剤10		㍩	月 日
			㍩	月 日
				月 日
				月 日
				月 日
				月 日
				月 日

記載内容検証:生産資材が適正に使用されていることを記載内容により検証しました。

月 日 JA担当者: 印